

Prélèvements vaginaux

1. **Introduction :**

Le laboratoire privilégie les prélèvements vaginaux sans speculum car il n'y a pas de différences dans l'interprétation clinique.

2. **Responsabilités :**

Les prélèvements peuvent être réalisés par les biologistes et les infirmières. Dans le cas où il n'y a pas de biologistes ou d'infirmière sur le site, l'auto-prélèvement est proposé. Le prélèvement doit se faire au laboratoire.

• **Préleveur :**

Remplir soigneusement la fiche de renseignements (DDR, Trt. en cours, grossesse...)

Identifier correctement les écouvillons (nom en majuscule ou étiquette).

Mettre le prélèvement dans une pochette double poche avec la feuille de renseignements.

3. **Prélèvement vaginal chez la femme adulte :**

a. **Lorsque l'ordonnance demande « Prélèvement Vaginal »**

Réaliser le prélèvement vaginal au niveau de la paroi vaginale et au niveau des culs de sac à l'aide de l'écouvillon en milieu de transport liquide (E-Swab).

b. **Lorsque l'ordonnance demande « Recherche de *Mycoplasma hominis* ou *Ureaplasma urealyticum* » :**

Réaliser le prélèvement au niveau vaginal à l'aide d'un écouvillon E-Swab puis replacer l'écouvillon dans son milieu de transport en vue de l'envoi en bactériologie.

c. **Lorsque l'ordonnance demande « Recherche de *Chlamydia* » ou *Mycoplasma genitalium* :**

Kit spécifique PCR *Chlamydia* Roche

Réaliser le prélèvement au niveau vaginal à l'aide de l'écouvillon spécifique et replacer l'écouvillon dans le milieu de transport spécifique (livré avec le kit PCR).

L'auto-prélèvement a été validé, lors d'une recherche de *Chlamydiae*. (Réf : BEH 3 octobre 2006).

d. **Auto-prélèvement :**

Il faut bien expliquer à la patiente comment faire et bien identifier les écouvillons, avant le prélèvement selon le document *SEL-PPI7E-001Vx-Auto prélèvement vaginal*

Cette méthode a été validée pour les chlamydiae, mycoplasmes et HPV (dépistage primaire).

e. **Lorsque l'ordonnance demande « Recherche de *Papillomavirus* » :**

Utiliser le kit SuperPath (labo Diag) fourni par commande interne au PT, cette recherche est réalisée au PT spécialisé, en dépistage primaire cette recherche est HN (50 euros).

4. **Frottis cervical :** lorsque l'ordonnance demande « Frottis »

Voir document SEL-PPI7I-314_Vx_Prélèvement ana-path société DIAG, seul les médecins et sage femme peuvent réaliser cet examen

5. **En cas de demande de recherche d'Herpès par culture :** kit Swab Combo Pack

Prélever le contenu d'une vésicule à l'aide d'un écouvillon et le mettre dans le milieu de culture spécifique.

6. En cas de demande de recherche d'Herpès par IF :

Identifier la lame avec étiquette du patient. Prélever le contenu d'une vésicule à l'aide d'un écouvillon. Réaliser 2 dépôts sur la lame, fixer en couvrant par une goutte d'acétone.

7. Prélèvement génital chez l'enfant ou la jeune fille (non pubère) :

Demandé l'avis d'un biologiste du laboratoire, on se contente généralement d'un écouvillonnage vulvaire (ne jamais mettre de spéculum). Toujours faire le prélèvement en présence de la mère ou d'une autre préleveuse. Utiliser les mini-écouvillons spécifiques

8. Prélèvement génital chez la femme enceinte :

Surtout ne pas utiliser de spéculum !

Le(s) écouvillons doivent être introduits d'environ 5 cm, bien contre la paroi vaginale pour éviter un contact intempestif avec le col et toutes les conséquences potentielles.

Recherche spécifique de Streptocoque du groupe B au 8^{ème} mois de grossesse.

Copie non gérée