RECOMMANDATIONS POUR LES PRELEVEMENTS D'ANALYSES BIOLOGIQUES

1 grand sec gel

Ac Thyroglob	Hépatite A+1pt
Ac TPO	Hépatite B+1pt
ACE	Hépatite C+1pt
Acide Urique	HDL, LDL
AFP	HIV+1pt
Albumine	IgA, IgG, IgM
AMH	Insuline
Amylase	iono(Na,K,Cl)
ApoA	LDH
ApoB	LH+DDR
B2microglob	Lipase
Barbitémie+HP	Lithium+HP
BHCG+DDR	Magnésium
Bilirubine T ou D	Orosomucoide
C3(complèment)	PAL
C4(complement)	Phénytoine
CA125	Phosphore
CA153	Préalbumine
CA199	NT ProBNP
Calcium	Procalcitonine
Cholesterol	Progesterone+DDR
Coef. Sat. Fer	Prolactine+DDR
Cortisol à 8h	Protéines
CPK	PSA T+/- L
Créatinine	Réserve Alcaline
CRP	ROMA
Dépakine+HP	SDHEA
Digoxine+HP	T3L
Estradiol+DDR	T4L
Fact Rhum/FR+1pt	Tégrétol+HP
Fer	Thyroglobuline
Ferritine	Toxo+1pt
Folates	Transa TGO/TGP
FSH+DDR	Transferrine
GGT	Triglycérides
Glycémie	TSH
Haptoglobuline	Urée
HE4	Vit B12
	Vit B9

1 grand sec gel (LIAISON)

BW (Syphilis)+1pt
Calcitonine
Chlamy Trac IgG+1pt
Covid IgG
Delta4androstène
Hélichobecter séro
Hépatite E+1pt
Herpès+1pt
Lyme sérologie+1pt
Myco pneumo+1pt
Oreillon IgG/IgM
Parvovirus IgG/IgM
Peptide C
PTH
Rougeole IgG/IgM
SBG
Somatomédine (IGF1) ***
Testostérone totale
Varicelle/Zona+1pt
Vit D/25D2D3

1 grand sec gel

Ac anti Beta2GP1	Electro/immuno
Ac anti cardiolipine	Waleer Rose/WRO
Ac anti DNA	IGA Chlamy Trachomatis
Ac anti ENA	IgE Spécifique (RAST)
Ac anti endomysium	IgE totaux
Ac anti gliadine	Phadiatop
Ac anti LKM	Rubéole+1pt
Ac anti nucleaire	Trophatop
Ac anti peau	RTSH
Ac anti pept citru	
Ac anti PMSCL	
Ac anti SLA	
Ac anti SP100	
Ac anti transglu	
Ac cellules pariet	
Ac mitochondries	
Ac muscle lisse	
Ac récepteur TSH	
AMPO	
ANCA	
APR3	
BABESIA sérologie	
Blot Lyme+1pt	
Brucellose	
CDT	
Chlamy pneumo	
CLA tropha	
CMV+1pt	
EBV / MNI+1pt	

1 petit sec gel

Acides biliaires

1 petit sec gel

Trisomie 21 ***

1 tube citrate

Anti XA ***+TTT+HP
AT3
D-Dimères
Fibrine
Héparine*** +TTT+HP
PRC
PRS
TCK/TCA + TTT
TP/INR + TTT

2 tubes citrate 5ml

Elispot

1 EDTA gel pour chacun

BNP
Charge virale HBV
Charge virale HCV
Charge virale HIV
Crosslaps/CTX
Rénine / Aldostérone (1)
Homocysteine ***

(1) NE PAS REFRIGERER

1 EDTA +aprotinine

ACTH ***

1 tube EDTA

Num. Formule
Plaquettes**
Réticulocytes
VS

** *si plaq basses piquer 1 citrate en plus*

1 tube EDTA pour chacun

Fol. erythrocytaire
HBA1C
Lympho NK CD57/56
Lympho T4/T8
Myoglobine
PCR MVT
RAI **/ Groupe sanguin**
** *photocopie de la pièce d'identité nécéssaire*

1 tube EDTA par détermination

Cas particuliers :

EDTA gel	PT Nice	BNP
EDTA	Triage et SM	
Grand sec gel	PT Nice	Troponine
EDTA	Triage	
Héparine de Lithium	SM	
		BHCG
EDTA	PI	BHCG
	PI	DD
	PI	Myoglobine
	PI	ProBNP
	PI	Procalcitonine
	PI	Troponine

1 tube fluoré pour chacun

Alcool
Glycémie
GPP
Lactates ***

1 tube sec urine pour chacun

Chimie urinaire
Cotinine
CXT
Drogue urinaire
Mycoplasmes urinaires

1 tube borate

CBU
(si flacon très peu peu rempli < à 4ml ne pas transvaser et conserver à 4°C)

e-SWAB

MYC
PEAU
Plvt Grippe
POEIL
PORL
PU
PUS
PUSCO
PV

Kit spécifique PCR

Recherche par PCR :
Chlamydiae
Coqueluche
covid / grippe / VRS
Herpès
Myco Genitalium
Neisseriae G.

Ordre de prélèvement sanguins :

Hémoculture puis :

1/ Sec gel
2/ Citrate
3/ Hép Lithium
4/ EDTA gel
5/ EDTA
6/ EDTA+aprotinine
7/ Fluorure

Ordre de prélèvement urinaires :

1/ Sec urine
2/ Borate

Légende :			
	***Merci de se référer à ilab	HP = heure prise médicament	TTT = traitement avec posologie
	INFORMATION pour les infirmiers libéraux : 1pt = prendre 1 petit tube sec gel en plus	DDR = date dernieres règles	

RECOMMANDATIONS POUR LES PRELEVEMENTS D'ANALYSES BIOLOGIQUES

1/ Associer dans un sachet par prélèvement : tube + fiche de prélèvement / ordonnance
2/ Respecter l'ordre de prélèvement
3/ Respecter le volume de remplissage

Tubes citrate : au dessus de la bande dépolie sur la paroi du tube

Autres tubes : au niveau de l'indicateur de remplissage sur l'étiquette

4/ Homogénéiser les tubes par 8 à 10 retournements lents

5/ Identifier les tubes selon la procédure et si utilisation d'une étiquette :

Sur le côté : toujours laisser visible le **niveau de remplissage** et la **date de péremption**



En hauteur : coller l'étiquette **à raz du bouchon** et sens de lecture du nom du patient **de haut vers le bas**

6/ Le transport des échantillons : dans les mallettes en présence d'un pack réfrigérant dès que la T° extérieure > 25 °C

7/ Cas particuliers :

Délais pour déposer les prélèvements au laboratoire	Prélèvements urinaires	Dossiers urgents	Non réalisable par des infirmiers extérieurs sauf si pré analytique respecté
< à 2h si Glycémie sur tube sec gel < à 4h pour l'analyse TCA et ACTH < 48h pour les urines collectées sur tube borate < à 6h pour le reste des analyses	Utiliser les tubes des collecteurs spécifiques biochimie et bactériologie Pour les comptes d'Addis : transmettre le pot avec 10ml minimum	Ajouter une collerette orange fluo sur la bague des tubes	Lactates, homocystéine, gastrine, CH50, somatomedine (IGF1) et Héparines